



COLONSCOPIA: Preparazione con AgPeg Plus

Gastroenterologo – Endoscopista digestivo
Dott. Prof. Antonio Iannetti

Università La Sapienza Roma - Policlinico Umberto I Roma: Docente di Endoscopia Digestiva I e III Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva; Docente di Malattie dell'Apparato Digerente I Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Dott. prof. **Antonio Iannetti** cell. 335.6935321
www.iannetti.it e-mail: antonio@iannetti.it

Esame richiesto: **RETTOSIGMOIDOCOLONSCOPIA (RSCS)**

SIG. _____

MOTIVO DELL'ESAME: _____

Medico richiedente:

.....

APPUNTAMENTO: Giorno _____ ore _____

Preparazione con AgPeg Plus (2 litri di soluzione):

Nei tre giorni precedenti l'esame è opportuno osservare una dieta priva di scorie (frutta, verdura, legumi, cibi integrali). Se possibile, ridurre anche la pasta.

Per soggetti stitici è consigliabile, durante i 3-4 giorni antecedenti l'esame endoscopico, assumere alla sera 2 o 3 compresse di Verecolene C.M.

Il giorno prima dell'esame assumere pasti leggeri senza frutta e verdura, fino a 3 ore prima di bere AgPeg Plus, dopo di che solo liquidi. In particolare:

A) se l'**esame** viene eseguito la **mattina successiva** (entro le ore 13), allora alle ore 18 del giorno precedente disciogliere 2 buste di **AG peg plus** in 1 litro di acqua. La soluzione così costituita deve essere bevuta al massimo entro un'ora (bere un bicchiere intero ogni 10 minuti). Mezz'ora prima di bere Ag Peg Plus si consiglia di assumere 3-4 cpr di Verecolene C.M. A seguire bere ancora almeno mezzo litro di acqua naturale (o altri liquidi chiari, cioè tè, camomilla, succhi senza polpa). Alle ore 21 bere il secondo litro di soluzione. Il giorno dell'esame si può bere solo acqua entro massimo 3 ore prima dell'esame.

B) se l'**esame** viene eseguito il **pomeriggio** del giorno **successivo** (dopo le ore 13), allora alle ore 20 del giorno precedente disciogliere 2 buste di **AG peg plus**

in 1 litro di acqua. La soluzione così costituita deve essere bevuta al massimo entro un'ora (bere un bicchiere intero ogni 10 minuti). Mezz'ora prima di bere Ag Peg Plus si consiglia di assumere 3-4 cpr di Verecolene C.M. A seguire bere ancora almeno mezzo litro di acqua naturale (o altri liquidi chiari, cioè tè, camomilla, succhi senza polpa). La mattina del giorno dell'esame -entro le ore 8-9 circa- bere il secondo litro di soluzione e poi assumere solo liquidi fino a massimo 3 ore prima dell'esame.

Evidenza di una corretta preparazione, è una evacuazione costituita da acqua limpida. Nel caso in cui questa preparazione per bocca non risultasse efficace (emissione di liquido denso cremoso o feci il giorno dell'esame), eseguire uno o due clisteri con **SORBICLIS** o un clistere con 1,5 litri di acqua tiepida almeno 2 ore prima dell'esame.

Il giorno dell'esame si può bere acqua fino a 2,5-3 ore prima dell'esame. Venire possibilmente accompagnati.